

# 茶黄蓟马 寄主：茶

*Scirtothrips dorsalis* Hood

	预防	监测	直接防治	直接防治	限制条件
 <p>茶蓟马为害症状 (来源：范长清)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>及时分批勤采嫩芽，适时修剪采摘嫩梢，控制虫口发生。</li> <li>冬季清园，喷施矿物油、石硫合剂等药剂后封园。</li> <li>及时清除田间杂草，清除虫害栖息场所</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>成虫和若虫均危害嫩梢</li> <li>为害后造成嫩叶卷曲、失水，叶质僵硬变脆。</li> <li>上午九时前调查，五点取样，每点取样1平方米，调查点内茶树嫩芽数及点内芽若虫和成虫总数。</li> <li>幼龄茶园平均每百芽叶虫量达到50-60头，成龄茶园平均每百芽叶虫量达到100头达到防治指标，考虑防治措施。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>蓝板诱杀，每亩安插20-25张，蓝板下缘离茶棚面5-10cm。</li> <li>印楝素</li> <li>金龟子绿僵菌</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>早上9:00-12:00时下午5:00-8:00时喷药，茶棚面和茶棚内均均匀喷雾。</li> <li>在若虫盛发期施药，注意轮换用药。</li> <li>当使用杀虫剂或植物性药物时，切记穿上防护服</li> <li>施用方法请参照产品标签上注明的剂量和施用时间等</li> <li>敬请咨询最新注册的农药清单</li> </ul>	
 <p>茶蓟马为害症状 (来源：范长清)</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>虫螨腈</li> <li>噻虫嗪</li> <li>呋虫胺</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WHO II类农药 (低毒) 安全间隔期为7天，每个生长季节使用不超过1次。对蜜蜂、水生生物、家蚕有毒。</li> <li>WHO II类农药 (低毒) 安全间隔期为3天，一季作物最多施用4次。对蜜蜂、水生生物、家蚕有毒。</li> <li>WHO III类农药 (低毒) 安全间隔期7天，每季最多用1次。对蜜蜂、家蚕、水生生物有毒</li> </ul>
 <p>茶蓟马为害症状 (来源：范长清)</p>					
 <p>茶蓟马为害症状 (来源：范长清)</p>					

## China

制定时间/修订时间: 2020年9月

作者: 范长清 夹江县农业农村局 谢馨健 为县农业农村局

编辑: Plantwise